

		راهنمای تهیه نمونه ادرار جهت کشت و آنالیز	
شماره سند: WI-138	تعداد صفحات از: ۱ از ۱	تاریخ صدور: 90/05/19	زمان بازنگری:
محدوده توزیع:	تهیه کننده:	شماره تجدید نظر:	

راهنمای تهیه نمونه ادرار جهت کشت و آنالیز برای نوزادان

۱- بهتر است نمونه ادرار اول صبح که حداقل هشت ساعت در مثانه مانده و تغلیظ شده مورد استفاده قرار گیرد.

۲- حداقل از سه روز قبل نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد.

* در صورت مصرف آنتی بیوتیک حتماً به آزمایشگاه اطلاع دهید.

* چنانچه بیمار دارو مصرف می کند حتماً در مورد داروهای مصرفی خود قبل از نمونه گیری با آزمایشگاه مشورت نماید.

* برای نمونه کشت باید از ظرف ادرار یکبار مصرف سترون شده و برای نمونه آنالیز از ظرف یکبار مصرف که هر دو از سوی آزمایشگاه داده شده است استفاده شود.

توصیه های لازم برای نمونه برداری از نوزادان:

۱- در نوزادان و کودکان زیر دو سال باید از کیسه ای سترون شده مخصوص جمع آوری ادرار (urine bag) که مناسب با جنسیت کودک می باشد (پسرانه یا دخترانه) استفاده کرد.

۲- پس از شستشوی ناحیه ادراری تناسلی بدون دست زدن به ناحیه تمیز شده این کیسه را به این ناحیه وصل میکنیم.

۳- این کیسه نباید بیش از ۴۵ دقیقه به مجرای ادرار متصل باشد وقتی حدود ۱۵-۱۰ میلی لیتر ادرار در کیسه جمع شد باید سر آن را تا نمود تا بسته شود و سپس تا ۱ ساعت به آزمایشگاه انتقال داده شود.

*از تماس ظرف با ناحیه ادراری تناسلی در هنگام جمع آوری ادرار خودداری شود. چون باعث آلودگی و در نتیجه تکرار آزمایش می شود.

" لطفاً بعد از اطمینان از مطالعه ی کامل برگه راهنما اقدام به جمع آوری نمونه

شود. عدم توجه به نکات بالا و ایجاد آلودگی موجب تکرار آزمون خواهد شد.

تایید کننده: دقیق آذر	تصویب کننده: دکتر پوربراهیم
همکاران محترم: جهت هر گونه تغییرات در این سند شما می توانید با پر کردن فرم مخصوص تغییر مستندات و هماهنگی با مسئول تضمین کیفیت اقدام نمایید.	